

SEU PET ESTÁ DOENTE?

Diagnóstico rápido e preciso é fundamental!

Saiba mais sobre as
principais doenças
que podem afetar
cães e gatos

VÔMITO?

FEBRE?

DIARREIA?

FALTA DE
APETITE?



eco

DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO

Cães:



01 | CINOMOSE

É uma doença viral altamente contagiosa que afeta cães, principalmente filhotes, que não cumpriram o quadro vacinal completamente ou não foram vacinados. O Vírus da Cinomose Canina (CDV) é um vírus da família *Paramyxoviridae* e a contaminação ocorre pelo contato direto com outros animais já infectados, por meio das vias aéreas quando se respira o ar contaminado ou por fômites, o que corresponde aos objetos que tiveram contato com o portador da cinomose. Sintomas comuns para a doença são: depressão, indisposição, secreções oculares (remela em excesso) e nasais (catarro), tosse, vômito, diarreia ou sinais no SNC. O vírus se instala inicialmente pelo sistema respiratório, então se seu animal apresenta alguns sintomas gripais, procure um Médico Veterinário para realizar o teste.

02 | PARVOVIROSE

É uma das doenças mais contagiosas e comuns nos cães e causa morte súbita em filhotes, sendo transmitida de animal para animal por meio de contato direto ou indireto pelas fezes ou contato com vômito. Animais que não cumpriram a carga vacinal estão propensos a se contaminarem. Causada pelo Parvovírus da família *Parvoviridae*, os sintomas mais comuns são febre, letargia, vômito, diarreia (em geral com sangue e cheiro muito forte), recusa de comida, hipotermia, taquicardia, desidratação, perda de peso, depressão, interior das pálpebras e gengiva pálidas. Procure o Médico Veterinário sempre que seu pet apresentar estes sintomas.

03 | LEISHMANIOSE

A Leishmaniose Visceral Canina, também conhecida como Calazar, é uma doença infecciosa não contagiosa transmitida tanto aos cães quanto aos seres humanos através da picada de um mosquito conhecido como mosquito-palha ou birigui. Este mosquito carrega o agente *Leishmania infantum chagasi*. A Leishmaniose Visceral Canina não tem cura, mas com diagnóstico prévio, existe tratamento paliativo. Os sintomas mais comuns são: Queda de pelos e descamação da pele, emagrecimento, feridas na pele, nas orelhas e focinho, perda de apetite e diarreia, febre, hemorragias nasais, anemia, perda dos movimentos das patas traseiras, dentre outros. A Leishmaniose mata! Procure o Médico Veterinário e previna seu animal da doença.

04 | CORONAVIROSE

Causada pelo *Coronavírus* (CCoV), assim como a Parvovirose, a sintomatologia clínica da Coronavirose é apresentada principalmente pela forma entérica e é bastante semelhante nestas duas doenças e, por serem facilmente transmissíveis, é de extrema importância realizar um rápido diagnóstico para que as medidas de combate, controle e prevenção sejam tomadas. Os sintomas mais comuns são febre, letargia, vômito, diarreia, recusa de comida, hipotermia, taquicardia, desidratação, perda de peso, depressão, interior das pálpebras e gengiva pálidas. Procure o Médico Veterinário sempre que seu pet apresentar estes sintomas para diferenciar as doenças e faça o teste rápido.

05 | BRUCELOSE

A Brucelose canina é uma doença infecto-contagiosa crônica, causada por uma bactéria, tendo como principal agente etiológico a *Brucella canis*. É uma doença que afeta o desempenho reprodutivo do animal, em machos causando infertilidade, aumento dos testículos, infecção de próstata. E nas fêmeas causa aborto, nascimento de filhotes fracos e secreções mucopurulentas vaginais. A transmissão da doença ocorre por sêmen contaminado do macho, contato de animais com as secreções genitais das fêmeas ou com os fetos que nasceram mortos. Não deixe seu animal se contaminar, busque orientação do Médico Veterinário.

06 | DIROFILARIOSE

A dirofilariose canina, popularmente conhecida como a doença do verme do coração, é uma doença parasitária cardiopulmonar causada pelo agente etiológico *Dirofilaria immitis*. A doença é transmitida por variados tipos de mosquitos, que penetram pelo tecido subcutâneo e muscular do animal picado, e, através dos vasos sanguíneos, atingem o coração. Se o animal apresentar sintomas, já significa que está em estágio avançado da doença, podendo apresentar um histórico de tosse crônica, com falta de ar ou ofegante, cansaço, intolerância a exercícios, mucosas pálidas ou ictericas, perda de peso, anorexia e insuficiência cardíaca, levando o animal à morte. Não espere o pior, faça já o teste rápido para confirmar o diagnóstico.

07 | GIARDÍASE

É uma doença parasitária causada pela *Giardia spp.*, que atinge cães no mundo inteiro. Esta zoonose é causada por um protozoário e resulta da ingestão acidental de cistos presentes nas fezes, nos alimentos e na água contaminada. A giárdia tem como principal sintoma a diarreia, com as fezes apresentando-se pastosas, de odor fétido e eventualmente esverdeadas, além da ocorrência de vômitos e flatulência. Consequentemente, os animais doentes podem apresentar perda de peso, desidratação e, em casos muito graves, óbito. Tanto filhotes quanto adultos estão sujeitos à infecção pela giárdia, sendo que aqueles que nunca foram expostos aos cistos possuem maior chance de apresentar sintomas clínicos. Fique atento aos sinais e busque ajuda com um Médico Veterinário para saber mais sobre a doença.

08 | ERLIQUIOSE

A Eriquiiose é causada pela bactéria *Ehrlichia canis*, transmitida pelo carrapato *Rhipicephalus sanguineus*, que provoca graves sinais clínicos podendo levar o animal à óbito. Os principais sintomas clínicos observados nos cães são: apatia, falta de apetite, febre, vômitos, diarreia, sangue pelo nariz, respiração ofegante e mucosas pálidas (sinal de anemia). O diagnóstico rápido é fundamental para a detecção da doença e tomada de medidas para tratamento pelo Médico Veterinário.

09 | ANAPLASMOSE

É uma doença transmitida pelo carrapato. A anaplasmosse canina é causada pela *Anaplasma spp.* No Brasil, o agente mais comum é a *A. platys*. É transmitida pelo carrapato *Rhipicephalus sanguineus*. Podem ocorrer co-infecções com *Ehrlichia canis* e *Babesia canis*, que são transmitidas pelo mesmo vetor. Normalmente, a infecção por *A. platys* causa apenas trombocitopenia acompanhada ou não de sinais como: anorexia, animal lento, perda de peso, depressão, mucosas pálidas e sanguinolentas que podem estar associadas com outras hemoparasitoses. Não deixe de fazer o teste rápido do seu cãozinho para diagnosticar a doença ao persistirem os sintomas.

10 | LYME

A doença de Lyme ou borreliose é uma doença parasitária de caráter infeccioso, causada por uma bactéria *Borrelia*, que acomete cães. A transmissão da doença aos animais ocorre através da picada de um carrapato infectado. Em cães, a doença se apresenta na maioria das vezes de forma assintomática. No entanto, quando há sinais clínicos, pode ocorrer comprometimento das articulações, febre, anorexia, letargia, inapetência e dor articular. Faça o teste rápido para a detecção da doença de Lyme.

Gatos:



01 | PERITONITE INFECCIOSA FELINA (PIF)

A Peritonite Infecciosa Felina (PIF) é uma doença infecciosa causada por vírus do gênero Coronavírus Felino (FCo V-1 e FCo V-2). É uma enfermidade sistêmica grave e tem alta mortalidade entre os gatos. Pode acometer gatos de todas as idades sendo mais comum em animais de até dois anos com sistema imunológico comprometido. Em alguns casos o gato pode contrair o vírus e o sistema imune eliminá-lo como se nada tivesse acontecido. Já em casos em que a resposta imunológica não é adequada, os felinos podem ter o vírus alojado em seu organismo por um longo período antes de apresentar qualquer um dos sintomas. Os sintomas são: febre, perda de peso e diarreia. Insuficiência hepática e renal, desorientação, vômitos e infecções oculares também podem apontar um possível diagnóstico da PIF. Confirme ou descarte a doença com os testes rápidos para a PIF, fale com seu veterinário.

02 | FIV /FeLV

A FIV é a doença causada pelo vírus da imunodeficiência felina, que compromete o sistema imune do gato de forma parecida com o que o vírus HIV faz com seres humanos - daí o nome popular de AIDS felina. Esse vírus pode ser transmitido de um gato para outro durante o parto, na amamentação, em brigas, no acasalamento e pelo contato com sangue e urina. O gato positivo para FIV tem a imunidade baixa e, por isso, é mais suscetível a doenças oportunistas. Uma simples gripe, por exemplo, pode ser difícil de ser combatida. Já a FeLV é a leucemia felina, também causada por um vírus que pode ser transmitido por meio de secreções como saliva, fezes, leite e urina de gatos infectados. No caso do animal ser positivo para FeLV, a imunidade baixa também é um problema, somada ao risco de desenvolver tumores. Faça o teste rápido para FIV e FeLV e tenha o diagnóstico em mãos dessa doença tão temida. Procure o Médico Veterinário.

03 | TOXOPLASMOSE

A toxoplasmose é uma zoonose de grande importância para a saúde pública. O gato, hospedeiro definitivo do *Toxoplasma gondii*, é o principal disseminador deste protozoário. Além do contato direto com as fezes infectadas do gato ou outros felinos, contendo oocistos esporulados no ambiente, o homem pode contrair o parasito através de alimentos contaminados ingeridos crus ou malcozidos (carnes, embutidos, etc), hortaliças, leite de cabra não pasteurizado, ovos, além da contaminação por transplantes e transfusão sanguínea. Os sintomas mais frequentes da doença no gato incluem a depressão, perda de peso, febre seguida por hipotermia, icterícia e falta de ar. Diagnosticando essa doença, você evita a contaminação e agrave do quadro.

04 | GIARDÍASE

Assim como em cães, esta zoonose é causada por um protozoário e resulta da ingestão acidental de cistos presentes nas fezes, nos alimentos e na água contaminada. A doença apresenta caráter grave em filhotes e gatos jovens, uma vez que acompanha quadros importantes de desidratação, letargia e perda de apetite. A Giárdia tem como principal sintoma a diarreia, com as fezes apresentando-se pastosas, de odor fétido e eventualmente esverdeadas, além da ocorrência de vômitos e flatulência. Os animais doentes podem apresentar perda de peso, desidratação e, em casos muito graves, óbito. Tanto filhotes quanto adultos estão sujeitos à infecção pela giárdia, sendo que aqueles que nunca foram expostos aos cistos possuem maior chance de apresentar sintomas clínicos. Fique atento aos sinais e busque ajuda com um Médico Veterinário para saber mais sobre a doença.

05 | PARVOVIROSE FELINA

Conhecido como o vírus da Panleucopenia Felina, o Parvovírus Felino (FPV) é responsável por causar enterites. Os gatos também podem ser infectados e desenvolver doença clínica após a exposição à cistos do Parvovírus 2 canino (CPV-2). O FPV está presente nas secreções nasais, fezes e urina. Ele é transmitido através de contato direto e fômites. Após a ingestão, o vírus entra no corpo por meio do intestino delgado. Sintomas comuns são febre aguda, vômito (mais comum), diarreia (menos comum do que em cães com parvovírus), inclinação da cabeça, descarga nasal e conjuntivite. A diarreia pode ser sanguinolenta.

eco

DIAGNÓSTICA

www.ecodiagnosticavet.com.br

+55 31 3653-2025 • contato@ecodiagnostica.com.br

